Nuevos datos Ecológicos sobre Buprestidos platenses

POR

J. TREMOLERAS

En una comunicación anterior (Boletín de la S. E. A., Nº 3, p. 13, Diciembre 1927) manifestaba la esperanza de que aquella pudiera servir de punto inicial para que los colegas extendieran las observaciones a mayor número de especies, y, en efecto, pocos días después de la publicación de mis Notas, recibí de mi distinguido colega Dr. Carlos Bruch los datos que van a continuación, a los que he añadido algunos míos. — J. T.

Euchroma gigantea (L.). — Sobre "palo borracho" (*Chorisia insignis*). — Prov. de Salta, dep. de Orán: Tartagal, enero y febrero (R. Schreiter leg.); Jujuy: proximidades de Embarcación (G. L. Harrington et C. Bruch leg.). — Común.

Psiloptera (Lampetis) **plagiata** (Gory). — Sobre "jarrilla" (*Larrea divaricata*). — Prov. de Catamarca, dep. de Andalgalá, durante todo el verano. Muy común.

Psiloptera (L.) **Bruchi** Obenb. — Sobre *Larrea divaricata*. Mendoza.

Psiloptera (L.) **Burmeisteri** Obenb. — Sobre troncos y ramas de las "arcas" (*Prosopis* sp.). — Prov. Catamarca: Santa María y Ciénega.

Psiloptera (L.) **corynthia** Fairm. — Sobre *Larrea divaricata*. — Provs. de Catamarca y Mendoza, enero y febrero. Común.

Psiloptera (L.) **esterensis** Obenb. — Muy común sobre "piquillin" (*Condalia microphyla*). — Prov. Córdoba: Alta Gracia, fines de enero y todo febrero.

Psiloptera (L.) **tucumana** (G. et P.). — Abunda mucho sobre la misma planta y en compañía de la especie anterior, durante la misma época del año. También se encuentra en Catamarca sobre "jarilla" (*Larrea divaricata*), pero los ejemplares de esta última localidad son de coloración verde metálica (nov. var.?).

Achardella denticollis (Fairm.). — Sobre el "jume" (*Spirestachys* sp.) y la "zampa" (*Atriplax Griesbachi*). Prov. San Luis; prov. Catamarca: Hualfin, Ciénega, Santa María. Muy común en enero.

Chalcopoecila ornata (Gory). — Sobre *Larrea divaricata*. — Prov. Catamarca: Hualfin y Ciénega, enero y febrero.

Chalcopoecila Leyboldti (Steinh.). — Sobre la misma planta y localidad que la especie precedente, aunque mucho más rara.

Tylauchenia crassicollis (C. et G.). — Sobre "piquillin" (*Condalia microphyla*). — Provs. de Córdoba (Alta Gracia) y San Luis.

Agrilaxia carbonaria Obenb. — En las flores de *Eryngium paniculatum*. — Uruguay: Arroyo Espinillo, dep. de Minas, mediados de diciembre.

Agrilaxia pallidecincta Obenb. — En las flores de *Ammi visnaga*. Prov. Córdoba: Alta Gracia, enero y febrero. Común.

Agrilaxia platensis Obenb. — En las flores de *Eryngium paniculatum*. — Uruguay: Arroyo Espinillo, dep. de Minas, mediados de diciembre.

Agrilaxia Strandi Obenb. — Sobre la misma planta, en la misma localidad y época que la especie precedente.

Paracuris hemiptera (Burm.). — Sobre "algarrobo" (*Prosopis alba*). Prov. de Mendoza, en enero. Común.

Curis bella (Guér.). — Hallada con frecuencia en las huertas sobre las flores de cebolla (*Allium cepa*). — Río Negro (R. Argentina).

Chrysobothris holochalcea Burm. — Ha sido hallada en la leña apilada en los ingenios de azúcar y estaciones de ferrocarril. Provs. de Salta, Tucumán y Catamarca.

Chrysobothris taciturna Kerr. — Sobre "espinillo" (*Acacia caavenia*). — Prov. Córdoba: Alta Gracia.

Chrysobothris Wagneri Obenb. — Sobre las ramas de "algarrobo" (*Prosopis nigra?*). — Provs. de Santiago del Estero y Catamarca.

Deyrollius nitidicollis (C. et G.). — Sobre las hojas tiernas de *Croton saltensis*. — Prov. Córdoba: Sierra de Alta Gracia.

Paragrilus coerulans Obenb. — Sobre *Croton saltensis*. — Prov. Córdoba: Sierra de Alta Gracia, diciembre y enero. Común.

Agrilus Bruchi Kerr. — Común sobre "peperina" (*Xenopomaodorum*) en Alta Gracia (Córdoba) durante diciembre y enero; La Plata (Prov. Buenos Aires), diciembre hasta febrero.

Agrilus graciae Obenb. — Sobre las hojas de *Vernonia mollissima*. Prov. Córdoba: Alta Gracia, fines de diciembre y en enero. — Tienen el mismo tono de verde que el de las hojas y se posan paralelamente a éstas. No es raro en ciertos lugares.

Agrilus gregalis Obenb. — Muy común sobre *Bacharis flabellata*. Prov. Córdoba: Sierra de Alta Gracia, diciembre y enero.

Agrilus masculisternis Obenb. — Se encuentra con la especie anterior, siendo también común sobre *Heterothalamus* sp.

Agrilus multispinosus (Klug). — Este agrilo se encuentra en Salta, en la leña apilada, junto con la *Chrysobothris holochalcea*. (Véase esta especie más arriba).

Agrilus Tremolerasi Obenb. — Esta especie, hallada en el Uruguay sobre flores de *Vernonia flexuosa*, resultó efectivamente ser nueva y es a la que se refiere una comunicación anterior (Boletín de S. E. A., N.° 3, pág. 14; Diciembre 1927).